



ALERTA ROJA PARA DETERMINAR EL TRASTORNO DE PROCESAMIENTO SENSORIAL (TPS*)

El Trastorno de Procesamiento Sensorial o TPS puede afectar a uno o varios sentidos (vista, gusto, tacto, olfato, oído, propiocepción y/o sentido vestibular/equilibrio). Algunos niños con este trastorno se sienten bombardeados por la información sensorial y la evitan. Otros, al contrario, parece que no se dieran cuenta de los estímulos que los rodean, y son indiferentes. Algunos “niños sensoriales” como se llama a quienes sufren este trastorno, tienen problemas de coordinación. A otros se les antoja tener estimulación sensorial intensa y activamente la buscan. Los síntomas varían dentro del trastorno. Si usted reconoce algunos de los siguientes síntomas en su hijo, debe mandarle a hacer exámenes o estudios para determinar si efectivamente tiene el trastorno de procesamiento sensorial.

Bebes entre cero y 36 meses

- Problemas de alimentación o sueño.
- Irritable cuando lo están vistiendo, incómodo con su ropa.
- Rara vez juega con juguetes.
- Resiste que lo alcen; curva la espalda cuando lo alzan
- No puede calmarse él solo.
- Torpe, poco flexible, cuerpo tieso. Demorado en actividades motoras.

Pre-escolares (niños y niñas entre 3 y 5 años)

- Muy sensible al tacto, ruidos, olores u otras sensaciones o a la gente.
- Se distrae fácilmente, se mueve mucho, es agresivo.
- Dificultad para vestirlo, darle de comer, dormirlo y/o entrenarlo para ir solo al baño.
- Dificultad para hacer amigos.
- Torpe, débil, habilidades motoras bajas.
- En constante movimiento; en la cara y en el espacio de todos.
- Pataletas frecuentes o largas especialmente cuando debe cambiar de actividades.

Niños entre 5 y 12 años

- Muy sensible al tacto, ruidos olores u otras sensaciones y/o a la gente.
- Se distrae fácilmente se mueve mucho, es agresivo.
- Se sobrecarga fácilmente, sintiéndose angustiado por las circunstancias.
- Dificultad para aprender a escribir o actividades motoras.
- Dificultad para hacer amigos.
- Indiferente al dolor propio o el dolor de los demás.

Adolescentes y adultos

- Muy sensible al tacto, ruido, olores, otras sensaciones y/o a la gente.
- Baja auto-estima, miedo o torpeza al comenzar nuevas actividades.
- Letárgico y lento.
- Siempre activo, impulsivo, distraído.
- Deja los trabajos sin terminar.
- Torpe, lento, habilidades motoras bajas.
- Dificultad para concentrarse.
- Dificultad para concentrarse en el trabajo y en reuniones.

Los síntomas del trastorno de procesamiento sensorial ocurren dentro de un amplio espectro de severidad. Mientras que la mayoría de la gente encuentra ocasionalmente dificultades para procesar la información sensorial, la característica en niños y adultos con TPS es que estas dificultades son crónicas, y les interrumpe el diario vivir. Este trastorno solo puede ser diagnosticado después de pruebas muy complejas que solo pueden ser practicadas por profesionales de la medicina, psicología o ramas relacionadas.

* En anglais: SPD

**Visite www.SPDFoundation.net
para aprender más acerca del Trastorno de Procesamiento Sensorial**



Enseñando el mundo acerca del Trastorno de Procesamiento Sensorial
www.SPDFoundation.net